

Přehled BPEJ

BPEJ	Třída ochrany	Klimatický region	Genetický půdní představitel	Sklonitost a expozice	Expozice	Skeletovitost	Hloubka půdy
3.03.00	I.	teplý, mírně vlhký	černozem černická (CEx), černozem černická karbonátová (CExc)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.08.50	III.	teplý, mírně vlhký	černozem modální (CEm), hnědozem modální (HNm), hnědozem luvická (HNI), luvizem modální (LUm), kambizem modální (KAm), kambizem luvická (KAl)	střední sklon 7-12°	V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.09.00	I.	teplý, mírně vlhký	šedozem modální (SEm), šedozem modální slabě oglejená (SEmg´), šedozem luvická (SEI)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.09.10	I.	teplý, mírně vlhký	šedozem modální (SEm), šedozem modální slabě oglejená (SEmg´), šedozem luvická (SEI)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.10.00	I.	teplý, mírně vlhký	hnědozem modální (HNm), hnědozem modální slabě oglejená (HNmg´)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.10.10	II.	teplý, mírně vlhký	hnědozem modální (HNm), hnědozem modální slabě oglejená (HNmg´)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.19.01	III.	teplý, mírně vlhký	pararendzina modální (PRm), pararendzina kambická (PRk), pararendzina vyluhovaná (PRv), kambizem modální (KAm), kambizem modální slabě oglejená (KAmg´)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.19.11	III.	teplý, mírně vlhký	pararendzina modální (PRm), pararendzina kambická (PRk), pararendzina vyluhovaná (PRv), kambizem modální (KAm), kambizem modální slabě oglejená (KAmg´)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.20.01	IV.	teplý, mírně vlhký	pelozem modální (PEm), pelozem vyluhovaná (PEv), pelozem melanická (PEn), regozem pelická (RGp), kambizem pelická (KAp), pararendzina pelická (PRp), regozem pelická slabě oglejená (RGpg´), kambizem pelická slabě oglejená (KApɡ´), pararendzina pelická slabě oglejená (PRpg´)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.20.11	IV.	teplý, mírně vlhký	pelozem modální (PEm), pelozem vyluhovaná (PEv), pelozem melanická (PEn), regozem pelická (RGp), kambizem pelická (KAp), pararendzina pelická (PRp), regozem pelická slabě oglejená (RGpg´), kambizem pelická slabě oglejená (KApɡ´), pararendzina pelická slabě oglejená (PRpg´)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.20.41	IV.	teplý, mírně vlhký	pelozem modální (PEm), pelozem vyluhovaná (PEv), pelozem melanická (PEn), regozem pelická (RGp), kambizem pelická (KAp), pararendzina pelická (PRp), regozem pelická slabě oglejená (RGpg´), kambizem pelická slabě oglejená (KApɡ´), pararendzina pelická slabě oglejená (PRpg´)	střední sklon 7-12°	J (JZ-JV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.20.51	IV.	teplý, mírně vlhký	pelozem modální (PEm), pelozem vyluhovaná (PEv), pelozem melanická (PEn), regozem pelická (RGp), kambizem pelická (KAp), pararendzina pelická (PRp), regozem pelická slabě oglejená (RGpg´), kambizem pelická slabě oglejená (KApɡ´), pararendzina pelická slabě oglejená (PRpg´)	střední sklon 7-12°	V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.41.89	V.	teplý, mírně vlhký	-	příkrý sklon, sráz	J (JZ-JV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, středně skeletovitá, silně skeletovitá (celkový obsah skeletu 0-100%)	půda hluboká, půda středně hluboká, půda mělká (od 0 cm)
3.51.11	IV.	teplý, mírně vlhký	kambizem oglejená (KAɡ), pseudoglej modální (PGm), kambizem glejová (KAq), regozem glejová (RGq)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.54.11	IV.	teplý, mírně vlhký	pseudoglej pelický (PGp), pelozem oglejená (PEɡ), pelozem vyluhovaná oglejená (PEvg), kambizem oglejená pelická (KAɡp), pararendzina oglejená pelická (PRɡp), regozem oglejená pelická (RGɡp), pseudoglej planický (PGpl)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.60.00	I.	teplý, mírně vlhký	černice modální (CCm), černice modální karbonátová (CCmc), černice arenická (CCr), černice fluvická (CCf)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.61.00	II.	teplý, mírně vlhký	černice pelická (CCp), černice pelická karbonátová (CCpc)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.62.00	II.	teplý, mírně vlhký	černice glejová (CCq), černice glejová karbonátová (CCqc)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.63.00	IV.	teplý, mírně vlhký	černice glejová (CCq), černice glejová karbonátová (CCqc)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
3.66.01	V.	teplý, mírně vlhký	stagnoglej modální (SGm), stagnoglej histický (SGo), stagnoglej pelický (SGp), stagnoglej planický (SGpl)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
3.67.01	V.	teplý, mírně vlhký	glej (GL), pseudoglej glejový (PGq)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
5.08.50	III.	mírně teplý, mírně vlhký	černozem modální (CEm), hnědozem modální (HNm), hnědozem luvická (HNI), luvizem modální (LUm), kambizem modální (KAm), kambizem luvická (KAl)	střední sklon 7-12°	V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)

5.10.00	I.	mírně teplý, mírně vlhký	hnědozem modální (HNm), hnědozem modální slabě oglejená (HNmg´)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.10.10	I.	mírně teplý, mírně vlhký	hnědozem modální (HNm), hnědozem modální slabě oglejená (HNmg´)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.11.00	I.	mírně teplý, mírně vlhký	hnědozem modální (HNm), hnědozem modální slabě oglejená (HNmg´)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.13.00	II.	mírně teplý, mírně vlhký	hnědozem modální (HNm), hnědozem modální slabě oglejená (HNmg´), hnědozem luvická (HNI), hnědozem luvická slabě oglejená (HNlg´), luvizem modální (LUm), luvizem modální slabě oglejená (LUmg´), fluvizem modální (FLm), fluvizem stratifikovaná (FLi)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.14.00	I.	mírně teplý, mírně vlhký	luvizem modální (LUm), hnědozem luvická (HNI), luvizem modální slabě oglejená (LUmg´), hnědozem luvická slabě oglejená (HNlg´)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.22.10	III.	mírně teplý, mírně vlhký	kambizem modální (KAm), kambizem psefitická (KAy), fluvizem modální (FLm), regozem modální (RGm), regozem dystrická (RGd), regozem psefitická (RGy)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.40.67	V.	mírně teplý, mírně vlhký	-	výrazný sklon 7-12°	J (JZ-JV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
5.42.10	II.	mírně teplý, mírně vlhký	hnědozem oglejená (HNg)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.44.00	III.	mírně teplý, mírně vlhký	pseudoglej modální (PGm), pseudoglej luvický (PGI)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.51.11	IV.	mírně teplý, mírně vlhký	kambizem oglejená (KAq), pseudoglej modální (PGm), kambizem glejová (KAq), regozem glejová (RGq)	mírný sklon 3-7°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)
5.58.00	II.	mírně teplý, mírně vlhký	fluvizem glejová (FLq), fluvizem oglejená (FLg)	úplná rovina, rovina, sklon 0-3°	rovina se všesměrnou expozicí, J (JZ-JV), V a Z (JZ-SZ, JV-SV), S (SZ-SV)	bezskeletovitá, s příměsí (skelet do 10%)	hluboká (od 60 cm)
5.68.41	V.	mírně teplý, mírně vlhký	glej (GL), glej histický (GLO), glej zrašelinělý (GLO´), černice glejová zrašelinělá (CCqo´)	střední sklon 7-12°	J (JZ-JV)	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (celkový obsah skeletu do 25%)	půda hluboká, půda středně hluboká (od 30 cm)